Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:55

Link do produktu: https://hurtpro.eu/activ-plyn-do-dezynfekcji-ahd-10002000-250ml-p-20480.html

ACTIV PŁYN DO DEZYNFEKCJI AHD 1000/2000 250ML

Cena	**75,68 zł**
Numer katalogowy	**48339247**
Kod producenta	**AC494 AC100138**

Opis produktu

AHD 2000

Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skóry i pola zabiegowego.

Charakterystyka produktu:
- wykazuje działanie natychmiastowe
- wykazuje działanie przedłużone (powyżej 3 godzin) potwierdzone badaniami
- ma szerokie spektrum działania; działa bakteriobójczo na bakterie Gram (+) i Gram (-) (w tym na Tbc), grzybobójczo; wykazuje pełne działanie wirusobójcze wg DVV (w tym HIV, HBV, HCV)
- wykazuje skuteczne działanie nawet w obecności zanieczyszczeń organicznych, jak np. krew, albuminy
- działa bardzo delikatnie na skórę; jest dobrze tolerowany nawet przy częstym stosowaniu przez osoby o wrażliwej skórze i skłonnościach do alergii
- zawiera etanol i substancje pielęgnujące skórę
- dodatek substancji nawilżających zapobiega wysuszaniu skóry
- nie utrudnia gojenia się ran
- ułatwia zakładanie i przyleganie rękawic ochronnych
- nie pozostawia na skórze substancji chemicznych obciążających i drażniących skórę
- preparat ma przyjemny, ulotny zapach
- każda butelka 250 ml wyposażona jest w atomizer

Skład chemiczny:
100 g preparatu zawiera: etanol - 79,9 g, butan-2-on - 0,75 g, olejki zapachowe - 0,02 g, stabilizator - 0,63 g, woda oczyszczona ad 100 g Stosowanie:
HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK - na uprzednio dokładnie umyte i wytarte jednorazowym ręcznikiem ręce, nanieść 3 ml preparatu. Dokładnie wcierać w skórę rąk, aż do wyschnięcia (ok. 30 sek.). Preparat stosuje się nierozcieńczony!
CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK - na dokładnie umyte, a następnie wytarte dłonie i przedramiona nanieść 5 ml preparatu i dokładnie wcierać, aż do całkowitego wyschnięcia preparatu, zwracając szczególną uwagę na czubki palców i obrąbek naskórkowy paznokcia - zabieg powinien trwać ok. 1,5 min. Zabieg należy wykonać dwukrotnie. Praparat należy stosować nierozcieńczony! DEZYNFEKCJA SKÓRY I POLA ZABIEGOWEGO -dezynfekowaną powierzchnię skóry pacjenta zwilżyć dokładnie preparatem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przed iniekcjami, pobieraniem krwi, szczepieniami, akupunkturą, zmianą opatrunków, przy zdejmowaniu szwów - odczekać minimum 15 sek. Przed operacjami i punkcjami - odczekać 1 min. Czynność należy wykonać dwukrotnie. Dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe (np. czoło) - odczekać 10 min. Przy stosowaniu aparatury elektrycznej odczekać, aż preparat całkowicie wyschnie. Obłożenia chirurgiczne i folie nakładać na skórę po całkowitym wyschnięciu preparatu.

Akceptowany przez wszystkie sanepidy.
Dystrybutor MEDILAB, producent Lysoform GmbH Niemcy

Pojemność: 250 ml z atomizerem