Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 05:23

Link do produktu: https://hurtpro.eu/neonail-lakier-hybrydowy-7-2-ml-ripe-cherry-p-10821.html




# NEONAIL Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Ripe Cherry

| | |
|---|---|
| Cena | **52,81 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **AC136111** |
| Kod producenta | **AC136111** |
| Kod EAN | **5903274040848** |

## Opis produktu

DATA WAŻNOŚCI: 11.22r.

**Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Ripe Cherry**

Dojrzałe wiśnie to wspomnienie lata – już teraz możesz umieścić jego część w swoim manicure hybrydowym. Ripe Cherry to odcień wakacji w butelce.

**Jak użyć**?

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć cleanerem.

2. Nałożyć cienką warstwę HARD BASE i utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli.

3. Nałożyć warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze i utwardzić w lampie LED/UV według tabeli (im ciemniejszy kolor tym dłuższy czas utwardzania). Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.

4. Nałożyć warstwę HARD TOP dla nadania bardzo wyrazistego połysku. W okresie letnim rekomendujemy stosowanie TOP Sunblocker zamiast topu Hard.

5. Utwardzić w lampie LED/UV według tabeli, po czym przemyć cleanerem.

6. W celu ściągnięcia z paznokci lakiero - żelu, należy zmatowić blokiem polerskim błyszczącą warstwę, następnie zastosować Aceton.

* w tym celu należy nanieść aceton na folię Foil Nail Wraps (lub zastosować wacik bezpyłowy i przykryć nim paznokieć, następnie owinąć go folią aluminiową) i pozostawić na okres ok. 10 min. Jeśli pozostaną resztki lakiero - żelu, należy usunąć je drewnianym patyczkiem lub metalowym kopytkiem.

**Skład**

DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE, HEMA, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, BIS-TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINE OXIDE, P-HYDROXYANISOLE, +/- CI 15850, CI 77499, CI 77492, CI 77510, CI 77742, CI 77891, CI 77289, CI 17200, CI 77007, CI 15985, CI 77491.

Tylko do użytku profesjonalnego. Proszę uważnie przeczytać sposób użycia. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu z oczami. Może powodować reakcję alergiczną. Zaprzestać stosowania przy wystąpieniu podrażnienia. Przechowywać z dala od dzieci.