Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 01:32

Link do produktu: https://hurtpro.eu/neonail-lakier-hybrydowy-7-2-ml-shiny-rose-p-10911.html




# NEONAIL Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Shiny Rose

| | |
|---|---|
| Cena | **54,32 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **AC136386** |
| Kod producenta | **AC136386** |
| Kod EAN | **5903274035653** |

## Opis produktu

**Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Shiny Rose**

Shiny Rose to biżuteria dla Twoich dłoni. Różowe złoto daje bogactwo możliwości – stylizacje z udziałem hybrydy będą pełne klasy i niewinnego uroku.

**Jak użyć?**

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć cleanerem.

2. Nałożyć cienką warstwę HARD BASE i utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli.

3. Nałożyć warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze i utwardzić w lampie LED/UV według tabeli (im ciemniejszy kolor tym dłuższy czas utwardzania). Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.

4. Nałożyć warstwę HARD TOP dla nadania bardzo wyrazistego połysku. W okresie letnim rekomendujemy stosowanie TOP Sunblocker zamiast topu Hard.

5. Utwardzić w lampie LED/UV według tabeli, po czym przemyć cleanerem.

6. W celu ściągnięcia z paznokci lakiero - żelu, należy zmatowić blokiem polerskim błyszczącą warstwę, następnie zastosować Aceton.

* w tym celu należy nanieść aceton na folię Foil Nail Wraps (lub zastosować wacik bezpyłowy i przykryć nim paznokieć, następnie owinąć go folią aluminiową) i pozostawić na okres ok. 10 min. Jeśli pozostaną resztki lakiero - żelu, należy usunąć je drewnianym patyczkiem lub metalowym kopytkiem.

**Skład**

Hydroxypropyl methacrylate, Dipentaerythritol hexaacrylate, HEMA, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Trimethylolpropane triacrylate, Glass, Bis-trimethylbenzoyl phenylphosphine oxide, Silver, Tin oxide, +/- CI 15800, CI 60725, CI 15880, CI 77510, CI 11710, CI 77891, CI 77266, CI 61565.

Tylko do użytku profesjonalnego. Proszę uważnie przeczytać sposób użycia. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu z oczami. Może powodować reakcję alergiczną. Zaprzestać stosowania przy wystąpieniu podrażnienia. Przechowywać z dala od

dzieci.