Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 17:16

Link do produktu: https://hurtpro.eu/neonail-lakier-hybrydowy-7-2-ml-thailand-beauty-p-10858.html

NEONAIL Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Thailand Beauty

Cena	**52,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AC136148**
Kod producenta	**AC136148**
Kod EAN	**5903274044778**

Opis produktu

DATA WAŻNOŚCI: 08.22r.

Lakier Hybrydowy 7,2 ml - Thailand Beauty

Wyrazisty manicure to wakacyjny must have! Daj się skusić na nieco szaleństwa i odważ się wypróbować nasz lakier hybrydowy w intensywnym odcieniu różu. Użyjesz go raz, a Thailand Beauty skradnie Twoje serce na zawsze!

Jak użyć?

1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć cleanerem.

2. Nałożyć cienką warstwę HARD BASE i utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli.

3. Nałożyć warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze i utwardzić w lampie LED/UV według tabeli (im ciemniejszy kolor tym dłuższy czas utwardzania). Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.

4. Nałożyć warstwę HARD TOP dla nadania bardzo wyrazistego połysku. W okresie letnim rekomendujemy stosowanie TOP Sunblocker zamiast topu Hard.

5. Utwardzić w lampie LED/UV według tabeli, po czym przemyć cleanerem.

6. W celu ściągnięcia z paznokci lakiero - żelu, należy zmatowić blokiem polerskim błyszczącą warstwę, następnie zastosować Aceton.

* w tym celu należy nanieść aceton na folię Foil Nail Wraps (lub zastosować wacik bezpyłowy i przykryć nim paznokieć, następnie owinąć go folią aluminiową) i pozostawić na okres ok. 10 min. Jeśli pozostaną resztki lakiero - żelu, należy usunąć je drewnianym patyczkiem lub metalowym kopytkiem.

Skład

DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE, HEMA, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, BIS-TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINE OXIDE, P-HYDROXYANISOLE, +/- CI 15850, CI 77499, CI 77492, CI 77510, CI 77742, CI 77891, CI 77289, CI

17200, CI 77007, CI 15985, CI 77491.

Tylko do użytku profesjonalnego. Proszę uważnie przeczytać sposób użycia. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu z oczami. Może powodować reakcję alergiczną. Zaprzestać stosowania przy wystąpieniu podrażnienia. Przechowywać z dala od dzieci.